

Sevgili anne-babalar,

Çocuğunuza yapılması planlanan ameliyatta narkoz verilmesi gerekmektedir. Bunun çocuğunuza sorunsuz ve güvenli biçimde uygulanabilmesi için lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Çocuğunuz ameliyat esnasında, ağrı hissetmeyeceği ve tıbbi müdahaleyi bilinçli olarak algılamayacağı uykuya benzer bir durumda olacaktır. Çocuk, ameliyat süresince, anestezi uzmanı bir doktor ve çocuk ve bebeklere narkoz işlemi eğitimi almış anestezi uzmanı bir hemşire ya da hastabakıcı tarafından müşahade edilecektir. Modern narkoz ve izleme cihazları, optimum güvenlik standardı sunmaktadır.

Narkozdan önce çocuğunuzun hastalığının şimdiye kadarki seyri hakkında bize bilgi verecek olan bir soru formu dolduracaksınız.

En geç narkozdan bir önceki akşam anestezi doktoru saat 17 ile 20 arasında sizi arayacaktır. Lütfen bize bildirmiş olduğumuz telefon numarasından bu saatler arasında ulaşılabilir olunuz.

Bu telefon görüşmesinde daha önce doldurmuş olduğunuz soru formunu hazırda tutunuz. Bu telefon görüşmesinde konuşulanların dışında aklınıza daha başka soruların takılması halinde, bize arka sayfada belirtilen telefon numarası üzerinden muayenehanenin normal mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz.

Narkozdan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Çocuğunuz ameliyata aç karna gelmelidir.

- **1 yaşından büyük çocuklar:**
 - Ameliyattan 6 saat öncesine kadar artık bir şey yiyemezler (şeker, sakız v.s. de dâhil).
 - Ameliyattan 3 saat öncesine kadar su veya şekersiz çay içebilirler;
 - Ameliyata 3 saat kala artık hiç bir şey içemezler.
- **Ayrıca 1 yaşından küçük bebekler:**
 - Ameliyattan 4 saat öncesine kadar emzirilebilirler.

Çocuğunuzun bu yaşa rağmen bir şey yiyip içmiş olması hâlinde, lütfen bizi mutlaka bilgilendiriniz!

Çocuğunuz ameliyata kadar enfeksiyöz olmalıdır:

- Lütfen kararlaştırılmış olan ameliyat tarihinden önceki hafta çocuk doktorunuza giderek, güncel sağlık testi ve anestezi doktoruyla görüşerek gerekiyorsa kan tahlili yapılmasını sağlayınız.
- Çocuğunuzun ameliyata kısa bir süre kala hastalanması hâlinde, lütfen hemen cerrahın muayenehanesine telefon ederek haber veriniz.
- Çocuğunuza ameliyata 2 hafta kala artık aşı yapılmamalıdır.

Ve:

- Çocuğunuza ameliyattan önceki akşam banyo yaptırılmalıdır.
- Lütfen cildine krem sürmekten kaçınınız.
- Çocuğunuzun özellikle yüzünde ve boynunda herhangi bir takı olmamalıdır.
- Çocuk gözlük kullanıyorsa, lütfen gözlük kabını da beraberinizde getiriniz.
- Çocuğunuzun ameliyattan sonra gerektiğinde yiyip içebilmesi için bir şişe çay ya da su (bebeklerde normal biberon maması) ve hafif bir yiyecek getiriniz.
- Çocuğunuz için rahat bir giysi (örn. eşofman), peluş oyuncak, kitap, MP3 çalar veya en sevdiği oyuncakçı getiriniz.
- Ameliyatın yapılacağı gün çocuğunuza ilaç ise, ancak anestezi doktoruna danışarak veriniz.
- Ameliyatın yapılacağı gün lütfen çocuğunuzun sağlık sigortası kartını ve doldurmuş olduğunuz narkoz soru formunu (eğer henüz vermemişseniz) beraberinizde getiriniz.

Çocuğunuza narkoz nasıl yapılmaktadır?

10 yaşına kadar olan çocukların hemen hemen hepsinde narkoz bir maskeden verilmektedir. Çocuktan, verilen narkoz ilacını bayılana kadar ağızdan teneffüs etmesi istenir. Ancak bundan sonra damardan sonda takılır ve ağrı fitili verilir ve ayrıca gerekiyorsa ameliyat edilecek bölgeye lokal anestezi uygulanır.

Çocuğunuza enjeksiyonla (iğneyle) narkoz verilebilmesi (genelde 10 yaşından itibaren) veya bunun nadir de olsa kimi zaman tıbbi açıdan gerekli olması durumunda, bu durum, anestezi ile önceden konuşulur.

1 yaşından büyük çocuklarda anne ya da babadan biri ameliyathaneye girebilir. Bu durumda çocuk anne ya da babasının kucağında bayılır.

Hamileler narkoz gazı etkisi yüzünden ameliyathaneye giremezler.

Çocuk bayıldıktan sonra, bir yüz ya da gırtlak maskesi veya sonda hortumu (solunum hortumu) üzerinden oksijen ve narkoz gazı verilmek suretiyle narkozun etkisi korunur. Ayrıca damardan ilaç verilir. Tam narkoz ve lokal anestezi şeklindeki bir kombinasyon, narkoz ilaçları ihtiyacını azaltabilir, ayılma süresini kısaltabilir ve çocuğun ameliyattan sonra çok daha az ağrı hissetmesini sağlayabilir. Narkozdan önce, narkoz sırasında ve narkozdan sonra çocuğunuzun kalbinin çalışması ve kandaki oksijen miktarı parmağına takılan bir sensör üzerinden gözlenir.

Lütfen ameliyat sürerken haber vermeksizin bekleme odasını terketmeyiniz ki, hemen ameliyattan sonra çocuğunuzun yanına alınabilesiniz.

Muhtemel narkoz riskleri

Hiçbir tıbbi müdahale risksiz değildir. Ama vücut fonksiyonlarının sürekli gözlem altında tutulması sayesinde doktor, muhtemel anormal durumları hemen farkedip, kontrol altına alabilmektedir. Gösterilen azami özene rağmen komplikasyonlar meydana gelebilir.

(Lütfen çeviriniz)

1

2

3

Narkozdan sonra çocuğunuzda kimi zaman kısa süreli huzursuzluk durumu veya mide bulantısı, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, yutkunmada zorlanmada, damarlarda tıkanma, basınçtan tahriş olan sinirlerde geçici rahatsızlıklar; hematoma veya iğne batırılan yerlerde iltihaplanma türünden rahatsızlıklar (örn. iğne abseleri veya doku hasarları) meydana gelebilir.

Narkozda çok ciddi durumların yaşanması son derece nadirdir.

Bunlar arasında mide salgısının akciğere kaçması, dişlerde, ağızda, gırtlakta ve ses tellerinde yaralanmalar, alerjik reaksiyonlar (örn. kaşıntı veya isilik), damarların yaralanması yüzünden oldukça şiddetli kanama, kan zehirlenmesi (sepsisemi), kan pıhtılaşması (tromboz) ve pıhtının hareket etmesi (emboli), şoka varan kalp-dolaşım sistemi sorunları, nefes alıp vermenin durmasına kadar yol açabilecek solunum sorunları ve kas metabolizmasının narkozda kontrolden çıkması anlamına gelen malign hipertermi yer almaktadır.

Narkoz esnasında ayılma veya ağrı hissetme de son derece nadir rastlanan durumlardır.

Narkozdan sonra nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

- Narkozdan sonra çocuğunuz ayılma odasına alınır. Burada genelde 2–3 saat tıbbi bakım ve gözetim altında tutulur.
- Ameliyattan hemen sonra 2 kişi çocuğun yanına gelebilir.
- Çocuğunuz narkozdan sonra uyandırılmamalı ve rahatça uyumaya bırakılmalıdır.
- Uyandırdığında, bize sorulması koşuluyla, önce bir şeyler içebilir ve eğer bünyesi kaldırıyorsa, az bir şey yiyebilir. Ardından damardaki sonda ağrı vermeyecek şekilde çıkarılır.
- Oyunlar ve kitaplar; taburcu olana kadar geçecek süreyi kısaltır.
- Çocuklar genelde ağrı kesici verilmesine gerek kalmayacak şekilde ağrısızca ayılırlar. Buna rağmen ağrı olması durumunda, ilâveten ağrı kesici verilir.
- Çocuğunuz ayılma odasında cerrah tarafından tekrar muayene edilir ve ilerideki günlerde izlenecek yol hakkında konuşulur.

4

- Ameliyatın yapıldığı gün eve dönerken çocukla yol boyunca ilgileyecek ikinci bir kişinin yanınızda gelmesini sağlayın.
- Çocuğunuz ameliyattan sonra henüz emin adımlarla yürüyemeyebilir. Ancak 24 saat sonra aktif olarak trafiğe çıkabilir. Lütfen bir sonraki günün sabahına kadar evde kesintisiz bakım sağlayınız.
- Çocuğunuz ameliyat yapıldığı gün yeteri kadar sıvı içebilir ve sadece hafif yemekler yiyebilir.
- Bebeklere normal öğünleri verilir.
- Öğleden sonra ve akşam ateşini ölçünüz.
- Gerekliyse cerrahın önerdiği ağrı kesiciyi veriniz.
- Anormal durumlarda (sargıda kan, sürekli kusma, 38,5 derece üzerinde ateş) lütfen cerraha haber veriniz.

Faturalarımızı bir özel doktor muhasebe merkezi üzerinden gönderdiğimizize ameliyat ücretini kendileri ödeyecek olan hastalarımızın dikkatini çekeriz.

Korkularınızı yenmeniz için size bu bilgilerle yardımcı olduğumuzu umuyoruz.

Anestezi ekibiniz

AnästhesieNetz Rhein-Ruhr

Anesteziyoloji uzman doktorları Akupunktur¹ · Hafifletici tıp² · Özel ağrı terapisi³

Rainer Möller · Dr. med. Bettina Claßen^{2/3}
Dr. med. Barbara Scharte-Günniker¹
Dr. med. Doris A. Niang³ · Thomas Gräber
Dr. med. Beate Albus-Kulka¹ · Christoph Blase
Dr. med. Gesine Schönberg^{2/3}
Dr. med. Uwe Freund · Andreas Koch

Merkez:

MEDICO-Haus
Westenfelder Straße 62/64
44867 Bochum (Wattenscheid)
Telefon 0 23 27 – 99 13 0
Telefax 0 23 27 – 99 13 10
www.anaesthesienetz.de
info@anaesthesienetz.de

DS M4-2 V4

5

HASTALARA BİLGİ

Çocuklarda hastaneye yatırmaksızın narkoz için



AnästhesieNetz
Rhein-Ruhr

MedicoZert®
Risk yönetimi

